
تجميعة روشتات طبيه





24_{Hours}
Of Simplified
Medicine
MedicineOfSlums





روسنا ميدود

Dr / Rasha Hany

روشتة لعلاج تساقط الشعر الغير وراثي Non Hereditary Hair loss

R /
HairStabil Shampoo

شامبو يفرك في الشعر لمدة خمس دقائق
ثم يشطف بالماء مرة يومياً

Tonoscalpine lotion لوشن يوم بعد يوم على الشعر المفسول الجاف

For hair & nail capsules

كبسولة مرتين يومياً لمدة شهر - ٣شهور
تحتوي على فيتامينات أو هو والزنك





Common cold & Influenza in babies نزلات البرد والانفلونزا عند الرضع

Rx:
Otrivin baby drops
مضاد للهستامين يزيل انسداد ورشح الأنف

Rx:
Pyral drops

ه نقط ۳ مرات يومياً حتى زوال الحرارة

Rx:
Hiconcil drops
تحل بالماء وتعط قطارة كل ٦-٨ ساعات
مضادات حيوية لحماية الجهاز التنفسي
or Duricef drops

Dr / Rasha Hany



***** For neonates below 3 months, it is better to give saline nasal drops (otrivin) & Avoid drugs that contain decongestant



علاج كدمة العين EYE TRAUMA

يجب عمل كمادات ثلج على محيط الإصابة لمدة ١٠-١٥ دقيقة لمدة ٢٤-٤٨ ساعة.

Rx / Alphinterin tab

قرص كل ٨ ساعات قبل الأكل


Rx / Reparil gel Or Hemoclar

دهان على مكان التورم كل ٨ ساعات ولكن يجب الحذر بحيث لا يدخل في العين


من الممكن إعطاء حقنة alpha-chemotrypsin ولكن بعد عمل اختبار الحساسية + إعطاء مسكن مثل Cataflam 50

تأكد من عدم وجود دم داخل العين فهذا يشير لحدوث نزيف داخلي Hyphema يجب الذهاب لطبيب الرمد في حالة خروج دم من العين أو الأنف أو الأذن وفي حالة فقدان الوعي وفي حالة ازدواج الرؤية

Dr 1 Ali Sallam



روشتة لعلاج قمل الرأس Lice




Licid Lotion

tetramethrin بماء وشامبو ثم يجب تسريحه بعد ذلك بالمشط لإزالة القمل

Contain Contain بخاخ للرأس يترك premethrin or

Dr / Rasha Hany



الاكزيما الجليدية Atopic Eczema

R / Corticosteroid cream
(should be applied for less than 1 week to avoid side effects)

مرتين يوميأ

قرص كل ٢٤ ساعة بعد الأكل (non sedating antihistaminic relief allergic reaction)

Kenacort vial (long acting corticosteroid used only for resistant cases)

مرة واحدة في العضل


Dr I Rasha Hany

^{**} Combination of tar & corticosteroid used in resistant cases of Eczema & Psoriasis.

^{**} Bentosal oint, Diprosalic oint used in eczema with hyperkeratinized skin

^{**} the cause should be avoided, eg: irritant clothing, chemicals and soaps.

worm infection in Children (Enterobiasis) روشتة للديدان في الأطفال



Rx: Bendax Susp.

جرعة واحدة يومياً ٠٠٠ مجم لمدة ثلاث أيام تكرر بعد أسبوعين ثم بعد أسابيع ثم بعد ٤ أسابيع Dr I Rasha Hany

Itching around anal

- + Insomnia
- + may appear in stool





R/

Cataflam 50 mg tablets

قرص عند الشعور بالألم بعد الأكل كما هو الحال مع جميع المسكنات القوية يحذر استعمال هذا المسكن لمرضى قرحة المعدى والحمل

R/B.B.C Spray

بخة - بختين مكان الألم عند اللزوم شل Lidocaine or Xylocaine spray



Dr / Abd Ulrahman Hamid





Abdominal colic & Distension in Children المغص والانتفاخ عند الأطفال

Dr I Rasha Hany

Rx:

Viseralgine Syrup ملي (نصف ملعقة) ٣ مرات يومياً حتى زوال المغص

Rx:
Simethicone suspension (Like Disflatyl)
مضاد للاثنفاخ وطار للغازات
مضاد للاثنفاخ وطار للغازات
ملي ٣ مرات يومياً قبل أو بعد الأكل



روشتة

العدوي العين في الأطفال RI terramycin eye مرهم قبل النوم لمدة أسبو ointmente

RI Ibidroxil 225 g susp.


ملطة صغيرة صبنداً ومساءً لأسبوع + يستبدل في الرضع


R/ Ibidroxil 125 mg susp.

Dr/Rasha Hany



تطلق كلمة suspension على الأدرية التي لا تذوب في الماء مثل المصادات الديزية وأدوية الدعوضة بينما تطلق كلمة الدراب على الأدوية التي تدوب في الماء مثل أدرية الكمة







R / lodosept antiseptic soln.

(to clean the Abscess or the wound)


Fucidin

(applied 2-3 times daily)
(its cream form for Face & wet places)
(its ointment form for dry skin)

Verlosef 500 caps.

(1 cap / 8 hr after meals)

Pressure Sore Development







روشتة لعلاج قرح الفراش Bed Sores

R/

Septocid Solution

لتنظيف القرحة مرتين يوميأ

Dermazade Spray


بوضع على القرحة مرة بومباً بساعد على التئام القرح وإذابة الانسجة المبتة بعطي ميبو كريم نتائج ممتازة ولكنه غير متوفر بكثرة

Baneocin Powder

بودرة للقرحة مرة بومياً بعد المطهر

Changing the position of the patient every 2 hours is a very important part of treatment.

Dr / Rasha Hany



Peptic ulcer and Helicobacter pylori



روشتة لقرحة المعدة نتيجة بكتيريا هليوباكتر بيلوري

R/ Ompepack cap كبسولة قبل العشاء يومياً

Klacid 500 mg قرص كل 12 ساعة بعد الأكل

for 2-4 weeks

for 2 weeks

Flagyl 500 mg قرص كل 12 ساعة بعد الأكل for 2 weeks

* the above prescription named (triple therapy) made especially for H.Pylori infection & formed of 1 PPIs & 2 broad spectrum Abx (clarithromycin) .. • H.Pylori blood test should be performed first



نصائح جميلة لمريض النقرس

الإكثار من السوائل=٢-٣ لتربومياً تناول كوببين مز الماء قبل النوم نناول كوب مز الماء بعد دخول الحمام إبدأ يومك التالب بكوب ماء التقليل مزب بعض الأطعمة المضرة للحالة مثل اللحوم والبقوليات والشروم والسبانخ والقرنبيط والفاصوليا والبازلاء والعدس والأطعمة البحرية والسكريات مثل المربى والعسل والبسكويت والابتعاد أيضاً عن المقالي

الإكثار من تناول الخضروات والسلطات + الإكثار من العنب إلا إذا كنت مريض بالسكري + عصير الجزر + أناناس تناول تفاحتين - ٣ يومياً فالتفاح له تأثير رائع في امتصاص الترسبات الضارة من حمض اليوريك

ط/على السيد سلام

نقص القيتامينات

Vitamin Deficency






Dr I Rasha Hany

Rx: Bebe VIT drops نقطة مرة يومياً قبل أو بعد الأكل

FerinSol drops نقطة يومياً بعد الأكل

* giving high doses of multivitamins may cause multivitamins Toxicity, also Ca+ Vit D overdose may cause calculus formation or early closure of Epiphysis.

- * It is proved that Iron supplement for babies & Up to 2 years of age is Important, since within this 2 years Iron can pass the blood brain barrier, sharing the development of Brain cells responsible later for child intelligence.
- * BeBe VIT drops used when there is multivitamin deficency, weakness & with antibiotic therapy & to increase appetite.
- * FerinSol drops recommended when there is Iron deficency anemia and to guard against Iron deficency.
- * Insure the parents that Iron preparations may cause temporary constipation, relieved few days after starting of treatment.



روشتة لعلام ضغط الدم المنخفض Hypotension

food (old cheese)

R / Effortil drops
20 drops directly in the mouth
or half glass of water 2-3 times
daily


والنال مي المالية

Dr / Rasha Hany

one amps. of Dexamethasone may be given as supportive therapy in severe Hypotension

Advise patient to take salty





Simple skin allergy or sunburn

حكة الجلد وحروق الشمس البسيطة

RI

Calamyl lotion

Tavegyl tab (antihistamine)

Allergex cream (antihistamine)

مرتين-٣ مرات يومياً على أماكان الاحمرار وحروق الشمس قرص كل ١٢ ساعة بعد الأكل مرتين يومياً على المنطقة العرضة لحكة الجلد

Dr / Rasha Hany

روشته لعلاج قرح القم for ttt of aphthous ulcer

salivex L oral paint or or oracure gel دهان للمنطقه المصابه ٥ مرات

یومیا betadine mouth



غسول للقم ٣ مرات يوميا











القولون التقرحي

Ulcerative colitis and Crohn's disease

Abd pain
+
Bloody diarrhea

روشتة للقولون التقرحي Ulcerative colitis

R/

Salazoyrin tab 5 ASAs

2-4 tab 4 times after meals, then 1 tab/6 hrs for 6 mon.

Hostacortin H tab CS

1 tab 3 times 1/2 hour before meals

R/

Azathioprine

1 tab daily

Only in paients with no response to 5 ASA or Corticosteroids

Dr.Ali Sallam

نصابح لعلاج النزلة المعوية Gastroenteritis



تعويض السوائل المفقودة بكثرة لتجنب الجفاف

لعِن -مكرونة - خضار مسلوق - مع غسل الطعام جيداً وتسخينه جيداً


إدخال الأغذية الطبيعية بالتدريج -

في اليوم الثانمي أكل البسكويت المالح والرز المسلوق

في اليوم الثالث نضيف اللحوم المسلوقة والبيض المسلوق

تجنب السكريات والأطعمة الحارة والمياه الغازية

ط/على السيد سلام







الإمساك عند الأطفال


Rx : Normalx drops فظرات قبل النوم DR / Rasha Hany



IF there is colic & Spasm

Rx:

Viseralgine Syrup ه ملي (نصف ملعقة صغيرة) للمغص



رو<mark>شتة لعلا</mark>ج التماب اللوز العاد

R/
Velosef 500 caps
كبسولة صباحاً ومساءً لمدة أسبوع

في الأطفال يستبدل بفيلوسيف شراب ٥٠ مجم كل ٦ ساعات وفي الرضع يستبدل ب٥١٥ مجم كل ٨ ساعات

Bradoral lozenges

قرص استحلاب كل ٦ ساعات

* it is antiseptic suitable for throat and buccal cavity infection

Tonsillitis may be accompanied by High fever, Headache, Difficulty in swallowing & enlarged pharynx.. sometimes tonsillitis may be masked (without fever) & recurrent masked tonsillitis may lead to Bacterial endocarditis.

Dr / Abd-Ulrahman Hamid





للوقاية من أشعة الشمس Sunscreen

R / Luna 35 lotion applied 15 minutes before exposure to sun

Exposure to the sun several times daily or many days without using sunscreen may result in sun burn or severe damage to the skin.

للوقاية من أشعة الشمس Sunscreen

في الأطفال أو الكبار عند التعرض للشمس لمجرد ساعات قليلة

R I Nivea 4 or luna 7

the number 7 means it gives sunprotection to the skin 7 times the normal skin.

Drl Rasha Hany






R/
Urosolvine eff. packets (contains colchicine)
باکو فی نصف کوب ماء ۳ مرات یومیا

No-Uric 100 mg tablets قرص ٣مرات يوميا بعد الأكل يجب تجنب اللحوم والقهوة والشاي والكولا والبقوليات

في الحالات الشديدة يُعطى مسكن ومضاد للالتهاب مثل ديكلوفيناك الصوديوم ٥٠ مجم ٣ مرات يومياً بعد الأكل



المالية من المالية

روشتة لعدوى الأذن الخارجية

Otitis Externa

R/ Isoptomaxitrol

12قطرة/3مرات يوم/أسبوع

antibiotic/Corticosteroid combination to cover infection , reduce inflammation & infection (like Dexamytrex terracortril)

Tavegyl tab

قرص مرتين ايوم

كبسولة كل 8 ساعات Ketologin 50 mg tab


Ketolgin is ketoprofen gives good analgesia for pain

Velosef 500 cap

كبسولة كل 8 ساعات

Cephalosporins guard against middle ear infection

Dr/Abd-Ulrahman Hamid



Spastic colon

Irritable Bowel Syndrome (IBS)



روشتة للقولون العصبي

R/

Brane tab قرصين 3 مرات يومياً بعد الأكل

Dusputaline tab دوسبتالين قرص 3 مرات يومياً قبل الأكل بنصف ساعة

Spasmodigestin tabs 15 ml 3 times before meals

Patient eduction:

-Food should be of low fat contant & High Fiber.

-Avoid stress.

Dr/Ali Sallam

عدوى القم بالقطريات عند الأطفال Oral Fungal Infection in children




Dr I Rasha Hany

Miconaze oral gel

ملعقة فم الفم كل 8 سناعات

Contain Miconazole (Broad spectrum antifungal)

* Appears as Whitish cover over the tongue.





روشتة لتنشيط الدورة الدموية مثل ضعف الذاكرة وقلة التركيز وبرودة الأطراف والدوخة


R/ Stugeron tab قرص مرتين يوميا بعد الأكل

it contains cinnarizine, it inhibuts transport of calcium ions, also has the same actions of antihistamines thus inhibits VC.

R / Triviastal tab قرص بعد الأكل ٣ مرات يومياً

Dr / Rasha Hany





روشتة لعلاج الانتفاخ وسوء الهضم والتطيل Flatulence

R/ luftal Chewable tabs

قرص يمضغ ٣ مرات يومياً بعد الوجبات -لوفتال يطرد الغازات مضاد للانتفاخ مثل Disflatyl

Caused by:

Rapid eating (Aerophagia)

Gaseous food

Diverticulitis (alternative diarrhea & Constipation)

Malabsorbtion

Bacterial or protozoan bowel infection

Patient education:

- * Avoid drinking while eating
- * Avoid Rapid eating (to avoid Swallowing Air)
- * Avoid Gaseous Food (Onion, Beans, Cabbage, Milk "tall glass of milk", Fruits
- "Whole apple or a guava")

easy medicine

dr_nour eldeen



روشتة للحروق Burns

A Hetti Broad enactrum anticantic

Betadine antiseptic Solution	ستطیعه یمکن آن یستخدم بدون تخفیف	Broad spectrum antiseptic
Dermazine cream	يوضع مرتين يوميا	Contain Sliver-sulphadizaine (antibacterial for variable dgrees of burn)
Sofratuli Gauz	شاش يوضع على المنطقة المحروقة مرة يومياً بعد الكريم	Contain sodium Fusidate
Ibidroxil 500 cap	كيسوئة كل ٨ سناعات حتى الانتفام	Contain cephadroxil
Mebo cream		Contain Collagenase Enzyme promote healing


Dr / Rasha Hany



the above prescribtion suitable for 1st and 2nd degrees of burn, (where the skin is not removed completely)

5 steps must be done for severe cases of burn,

- 1-deliver the patient to hospital
- 2- remove clothes Fix cannula (to give IV Ringer & Saline)
- 3-Antihistamine amp (Avil) + corticosteroid (epidron) + tetanus toxoid (do allergic test)
- 4-Analgesic injection (Voltarin)+anticoagulant
- 5-Eye drops or ointment (terramycin or apigent)



روشتة لإزالة رائحة القدم - القدم الرياضي Fungal infection between toes -Athletic Foot



Cansten Solution	يوضع مرتين يومياً بعد التنظيف بين الأصابع بماء دافئ وصابون	It has a broad spectrum antifungal activity.
Miconaz	يوضع مرتين يوميا بعد	Contain Miconazole ,a broad spectrum
Powder	المحلول	antifungal.

Dr / Rasha Hany





Otitis media in children روشتة لعدوى الأذن الوسطى في الأطفال

Rx: Duricef 250

ه ملي (نصف معلقة) كل ٨ ساعات لمدة ٧ أيام مضاد حيوى واسع الانتشار

Rx: Apigent ear drops

قطرة قطرتين ٣ مرات يومياً لمدة ٧ أيام إذا كانت العدوى مصاحبة بالتهاب مضاد حيوى

Rx: Earcure ear drops or Otocalm فَطَرِةَ فَطَرِيّن ٣ مرات يومياً لَمدة ٧ أيام

Rx: Voltaren 12.5 & 25 supp. لبوس كل ١٢ ساعة يحتوى على ديكلوقينات و هو مسكن قوي

Dr I Rasha Hany









Tonsilitis or Throat infections

التهاب اللوز والحنجرة


Rx: Flumox 250 susp.

مضاد حيوي ملي (نصف ملعقة صغيرة) كل ٨ ساعات لمدة أسبوع

Rx :
Brufen Susp.
خافض للحرارة
ملي كل ٨ ساعات

Tonsilitis
usually accompanied
with high fever,
difficulty in swallowing &
enlarged pharynx ...
may be masked
(without fever)

Dr I Rasha Hany





روشتة لمساسية الأنف

Nasal allergy & congestion

R/

Prisoline drops نقطتین فی کل انف ۳ مرات یومیاً

R/

Claritine tablets قرص واحد يومياً بعد الأكل مثل Ioratine or Ioratan

Dr / Abd-Ulrahman Hamid





روشنة لعلاج الجرب Scabies

Sulpher Soap	صابونة يغسل بها الجسم كله بالماء الدافئ	Sulpher has good activity against scabies.
Eurax lotion	دهان للجسم ماعدا الرأس والوجه مرة يومياً ل ٣ أيام	Contain Crotamiton eradicate scabies after 3 days of treatment

بالرغم من سهولة علاج مرض الجرب إلا أن العدوى به سهلة لذلك يجب عدم لبس ملابس المصاب أو لمسه أو النوم بجواره حتى تنتهي مدة العلاج ،، ويجب تغيير الملابس ومفرش السرير وغليهم كل مرة بعد الدهان لمنع استمرار العدوى أو رجوعها.



Dr / Rasha Hany



Chronic Bronchitis Smoker's lung

If you smoke: QUIT! It is never too late

You cough alot + Thick sputum difficult to cough up

روشتة للنزلة الشعبية المزمنة

Chronic Bronchtis

flumox 500 mg كبسولة 3 مرات لمدة خمس أيام مضاد حيوي

 Aironyl Syrup ملعقة كبيرة 3مرات يومياحتي الشفاء bronchodilator

Bronchophan syrup

ملعقة كبيرة 3 مرات

acts as cough suppressant, decongestant , antihistaminic & mucolytic

Dr / Mido



روشتة لعلاج حب الشباب Acne

R I Sacnel Soap

يستعمل ويحك برفق على الوجه لمدة خمس دقائق ثم يشطف بالماء


Erytin gel (Antibacterial + tretinoin "vit A")

يدهن مساءً تمدة شهر

Vibramycin capsules (doxycilline)

كيسولة يوميا لمدة ١٠ أيام

** The patient should not be exposed to sun after application of any acne preparation to avoid any skin inflammation.



نصائح لريض القولون العصبي والانتفاخ

الامتناع عن الأطعمة السببة للانتفاخ مثل القليات في الزيوت (الطعمية- الباذنجان- السمك-

البطاطس)

اللحوم السمينة (البط – الحمام –الضأن-الكبد-...) البصل والخضار السبك و القشدة والكريمة بعض الفواكة (المانجو-الجوافة-التين-المشمش-

البطيخ)

الحوادق: الفسيخ -الرنجة-الطرشي-الزيتون-الجبن شديد اللوحة-الأسماك المحفوظة

الحوارق: القلقل - الشطة

عدم الأكل بسرعة وعدم شرب الماء أثناء الأكل

عدم شرب البيبسي والقهوة والشاي والعلبات

توزيع الطعام على عدة وجبات صغيرة خلال اليوم بدلاً من ٣ وجبات

شرب لتر ونصف إلى لترين ماء

تجنب الضغط النفسي والتوتر

ط/ على السيد سادم




روشتة للصداع النصفي Migraine

R / Migranil tab

2 tab when needed, can be repeated after 2 hrs

Migranil contains Ergotamine and painkiller like paracetamol.



Dr/Rasha Hany



روشتة لعدوي العين في الكبار

RI terramycin قبل النوم

RI Ibidroxil 500 cap. صباحاً ومساءً لمدة أسبوع

RI occuphenicol eye drops نقطتین فی کل عین ؛ مرات یومیاً

Dr/ Rasha Hany






Constipation in Babies الإمساك عند الرضع

Dr I Rasha Hany

Rx: Glycerine supp. لبوسة واحدة عند اللزوم مرة أو مرتين يومياً

يمكن إعطاء ه ملي لاكتيلوز شراب مساءً لمدة أسبوع أو أكثر فهو يساعد على تنظيم عملية الإخراج





روشتة لإزالة ألم الأذن وشمع الأذن


Ear wax & pain

R/
Remwax ear drops (otocalm ear drops)
نقطتين في الأذن 3 مرات يومياً

cataflam 50 mg tab قرص بعد الأكل عند الشعور بألم في الأذن في الأطفال يستبدل بكتافلام نقط أو نوستان شراب

If the wax not dissolved within 3 days, ENT Specialist can remove it by earwax waching apparaus as it may impair hearing.

Dr / Abd-Ulrahman Hamid



نصائح لمريض هشاشة العظام

شرب اللبز

+ أكل الجبن والبروتين النباتي

مثل البقوليات.

+ الابتعاد عن البروتين الحيواني حيث أنه يخرج الكالسيوم في البول


أكل الموز والكنة الوب مفيد

ممارسة رماضة المشي بانتظام

تجنب تناول الاملاح لأنها تخرج الكالسيوم في البول

الابتعاد عز التدخين





إذا استلزم الوقوف فيجب وضع إحدى القدمين على درجة وثني الركبة وتجنب المشي حافي القدمين على السيراميك.

- تجنب الجلوس أو الوقوف لفترات طويلة أكثر من · · دقيقة وإذا كان لا بد فنأخذ فاصل دقيقتين من الحركة.

- تجنب حدوث الإمساك وعلاجه جيداً بالملينات وتناول الخضروات والفواكه.

-عند النهوض من النوم :: يشني الشخص الركبتين ويستدير على جنبيه ثم الجلوس ثم القيام عن طريق دفع الأيدي وعكس الخطوات عند النوم.

- النوم على أحدا لجنبين مع وضع وسادة بين الفخذين + وضع وسادة تحت الركبتين والقدمين

روشتة لألم وشمع الأذن

Ear Wax & Pain


Dr / Rasha Hany





Remwax Ear drops قطرتين 3 مرات يومياً لمدة 3 أيام	Dissolve Ear Wax
Megafen Susp. 10-5 مل كل 8 ساعات بعد الأكل	Contains Ibuprofen analgesic, antipyretic, suitable for 6 month of age and above

^{*} If the wax is not dissolved within 3 days, ENT specialist can remove it by earwax washing apppratus.



طعام مريض قرحة المعدة Peptic Ulcer

اللبن - منتجات الألبان (الزبادي) - بيض مسلوق - أسماك خضار مسلوق (بسلة - فاصوليا - جزر - قرنبيط) + أرز

كيفية تناول الأكل ؟؟؟؟

١-تناول الوجبات الثلاثة بانتظام

 ٢-تثاول وجبات صغیرة بین الوجبات الرئیسة (جیلی - مهلبیة زیادی - کیك - بسكوت)

٣- تجنب تناول الطعام ساخن أو بارد.

٤- عدم الثوم بعد الأكل مباشرة وعدم الأكل بسرعة

٥-تناول كميات جيدة من الماء

يفضل الفاكهة الغير حمضية مثل: تقاح - تين - تمر - فراولة - عنب - كمثرى

تجنب الفاكهة الحمضية مثل: البرتقال - الليمون -اليوسفي - جريب فروت - مشمش - برقوق - أثاثاس تجنب الشاي والقهوة والمشروبات الغازية والحلويات الدسمة.

نجنب البهارات والمقليات (الطعمية-الباذنجان-البطاطس-.....) واللب والمكسرات والأملاح (جبن رومي -....) والليمون والدهون والخل والملوخية والسبانخ والبقدونس

ممنوع منعأ باتأ الأسبرين وأدوية الروماتيزم والتدخين

عدم ارتداء ملابس ضيقة على منطقة البطن

ط/على السيد سلام



روشتة لعلاج الإمساك عند البالغين Constipation

R/

** Minalax tab

(1-2 tabs Before bed time)

** Nu-Spasm tab (Buscopan)

(1-2 tabs if there is a colic)

لمنع التقلصات المصاحبة

Most laxatives are contraindicated during pregnancy & Lactation.

Patient Education:

*Drink 8 glasses of Water each day.

* High Fiber Food (Whole grain breeds, Cereals and rice)

(Fresh fruits except for banana)


(Vegetables except for potatoes)

(Dried Fruits: Prunes, apricots & Figs)

(Legumes: Chick peas, backed beans, lima beans & Soya beans)



^{*} try to limit stress on your life



Sudden cough longed for few davs + mucus + Fever + SOB نتيجة للسجائر أو عدوى بكتيرية أو فيروسية يجب على المريض التوقف فوراً عن التدخين والبعد عن الزحام والأماكن المئثة ويجب شرب كميات كبيرة من الماء

روشتة لعلام النزلة الشعبية الحادة

R/ Hibiotic 625 mg

قرص كل 8 ساعات لمدة 5-10 ايام

It is amoxicillin (others like augmentin)

Mucophyline Syrup

ملعقة كبيرة 3 مرات يومياً بعد الأكل


it is bronchodilator and mucolytic


مذيب للبلغم

Abimol tab.

قرص إلى قرصين 3 مرات يومياً بعد الأكل contains paracetamol acts as antipyretic خافض للحرارة

Dr / Mido





تصانح لريض حصوات الكلي Renal Stones

- تجنب اللحوم والبروتينات.

- تجنب الأطعمة التي تحتوي على أوكزالات مل السيانخ والطماطم والشوكولا والفول السوداني والمكسرات والبقوليات الخضراء والفراولة والتفاح و الشاي والقهوة والكولا.

- تجنب اللبن والبيض والأطعمة المحتوية على كالسيوم.

- تناول أطعمة قليلة الملح .

- الإكثار من شرب الماء

ط/على السيد سلام





Abdominal Colic & Distension in Babies المغص والانتفاخ عند الرضع

Rx:

Gripe water

ملي (نصف ملعقة صغيرة) ٣-٤ مرات يومياً
بزيل الانتفاخ والمغص

Dr I Rasha Hany

Rx: Semithicone drops ١٠ نقط ١-٣ مرات يومياً في حالة وجود غازات وانتفاخ

Rx:
Spasmotal drops (Buscopan drops)

ا نقط ٣ مرات يومياً حتى زوال الألم
مضاد للتقلصات في الرضع



Eye Congestion


روشتة لاحتقان العين نتيجة الإرهاق والقراءة ومشاهدة التليقزيون والحسساسية

R/ Visine AC drops (one drop 3-4 times daily)

فايزين يجب استعماله بصورة متقطعة وليس بصورة متواصلة لان استخدامه لفترات طويلة يؤدي إلى عدم المقدرة على الاستغناء عنه لاحتوائه على كورتيزون

Dr / Rasha Hany





Betaserc (Microserc)

قرص ۳ٌ مرات يوميأ ينشط الدورة الدموية في المخ


Vascular Cap

كبسولة كل ١٢ ساعة بعد الأكل

روشتة لعلاج الدوخة وطنين الأذن



Dr / Rasha Hany




Motion Sickness

R/
Sultan caps.
2 tab 2 hrs before the travel

***** sultan like Dramenex tab.

 patients suffering from motion sickness shoudn't eat at least 2 hours before journey

Dr / Ali Sallam



Dr / Mido



روشتة للأزمة التنفسية — ضيق التنفس

R1 /
Bricanyl syrup or tab
قرص 3 مرات يومياً أو ملعقة كبيرة
مثل Aironyl

R2/ Ultrasolv Syrup معلقة 3 مرات يومياً بعد الأكل

R3/ Kenacort Vial

حقنة تعطى مرة واحدة بعمق في العضل لا تكرر يستمر مفعولها عدة اسابيع (شهر أو أكثر) ويفضل عدم إعطائها إلا إذا لم تفلح الأدوية الغير كورتيوستيرودية لما لها من أضرار جانبية ويعطى معها مضاد حيوي كوقاية

R4/

Calcium amp.

أمبول ببطء شديد في الوريد يومياً لمدة 3 أيام يعطى ببطء بإشراف دكتور لأن إعطاءه بسرعة يسبب توقف القلب

الرقية Neck Pain

- أثناء القراءة قرب الورقة إلى وجهك ٣٠ سم وحذاري أن تحنى وجهك نحو الورقة

-إذا استدرت للرد على شخص فاستدر بكامل جسمك وليس برقبتك فقط

- تجنب الجلوس أو الوقوف لأكثر من ثلاثين دقيقة متواصلة

- حاول أن تجعل الرأس والعمود الفقري في خط واحد .

- تجنب الاستلقاء على الأربكة والرأس على مسند الذراع

فيجب أتكون في وضع مستفيم ومسطح.

- ممنوع النوم أثناء الجلوس على الكرسي.

-لن يجلس على المكتب: استخدم كرسي له مساند لليدين

وإذا لم يوجد يجب وضع اليد على المكتب.

-وضع الثلج على المنطقة المؤلمة والمتصلبة ثم أخذ حمام ساخن مدة طويلة

وتركيز الماء على الرقبة أو تسليط مجفف الشعر الساخن على الرقبة.

ط/علي السيد سلام





روشتة للكمة الجافة الناتجة عن المساسية Dry Allergic cough

R/ Congestal Syrup ملعقة 3 مرات يومياً بعد الأكل

Ventolin 2 mg tab. قرص 3 مرات يومياً بعد الأكل

Vendexine Syrup 20 مل مرتين بعد الأكل لمدة 3 أيام

Vendexine Syrup contains antihistamine chlorpheneramine & Dexamehasone which has magic antiallergic & cough relief effect ... but due to its side effects, it is added when other measures are not effetive & the patient case allows Corticosteroid Therapy.

Dr / Mido

روشتة لألم وشمع الأذن

Ear Wax & Pain

Dr / Rasha Hany





Remwax Ear drops قطرتین 3 مرات یومیاً لمدة 3 أیام	Dissolve Ear Wax
Megafen Susp. 10-5 مل كل 8 ساعات بعد الأكل	Contains Ibuprofen analgesic, antipyretic, suitable for 6 month of age and above

^{*} If the wax is not dissolved within 3 days, ENT specialist can remove it by earwax washing apppratus.



نصائح لعلاج آلام الركبة Knee pain

-لا تجلس أو تقف لفترات طويلة. .

- تجنب الجلوس على الأرض.

بجنب تكرار صعود ونزول السلم كثيراً.

- اجعل الركبة في وضع وسط بين النبي والإمداد أثناء الجلوس.

والم مندار الله الله موتين - ٣موان يومياً أثناء

الراحة ولكن ليس قبل المشي والنشاط.

وسلامتكم.

ط/على السيد سلام



Snoring

R/

Snor enz oral Spray

بختين بالنم قبل النوم بساعتين على أن يكون بعد الأكل بساعة

R/
Snore no more nasal spray
بخة بكل فتحة أنف قبل النوم بساعة

Dr / Abd-Ulrahman Hamid







روشت<mark>ة لعدوي الفم بالفطريات</mark> oral fungal infection, Oral Candidiasis

RI Betadine mouth wash مضمضة تلفم ٣ مرات يومياً

Vibramycin cap. كبسولة يومياً لمدة ٥٠٠٥ أيام بعد الأكل بساعة

Amrizole 250 mg tab قرص ٣ مرات يومياً بعد الأكل it also remove bad odour of stool

Drl AbdUlrahman Hamid







Rx /
Ditropan (1x3)
قرص کل ۸ ساعات

Or

Rx / Minrin tab قرص وقت النوم

Dr | Ali Sallam

ينصح بعدم إيقاف الدواء دون استشارة الطبيب



الأكل عدة مرات في اليوم "

- مع التقليل من الكربوهيدرات (الأرز المعركونة الخبز ع

- زيادة تناول الملح . (غير مستحب)

- ملعقة عسل نحل كل ساعتين إذا لم يكن مويضاً مالسك

-تناول مشروب ساخز_ كل ٣ ساعات وخاصة القرفة - الزنجبيل -

القهوة - وحبة البركة.

ط/على السيد سلام





روشتة لرائحة الفم الكريهة

Bad odour due to mouth soft tissue infection

R/

Betadine mouth Wash

(gargle for 3 minutes/8 hrs)

Vibramycin cap.


(one cap. daily for 5-10 days)

Amirzole 250 mg tab.

(one tab. 3 times daily after food)

Dr/Abd-Ulrahman Hamid

نصانح علاجية للضغط الرتفع HTN - Eclampsia - G.Edema



أكل بدوزب ملح - تناول الكركدية والنعناع ذو فائدة

الإقلال من الشاي والقهوة والنسكافية - الإمتناع عن التدخين المشي نصف ساعة ٣ مرات أسبوعياً - إنقاص الوزن

تناول الأسماك ٢ مرات أسبوعياً + تناول الخضروات والفاكهة - استخدام زيز الزينون يسمح بتناول الكربوهيدرات

الأطعمة المنوعة:

المخلل - الطرشي - الزيتون - البسطرمة والتونة والأطعمة المحفوظة والأسماك المعلبة - الما يونيز والكاتشب الصلصة - المكسرات المعلجة كل أنواع الجبن ماعدا الخالي من الملح - البطاطس الشيسي المكاكاو - الشيكولاتة - الخميرة والبيكنج بودر - الشورية المالحة - الزيدة

المشروبات الغازية - اللحوم السمينة - والمقليات والأكل الدسم.

Common cold & Influenza in Children نزلات البرد والإنفلونزا عند الأطفال



Rx:

E-Mox 250 mg
مضاد حيوي
ما معلقة صغيرة كل ماعات لمدة خمس أيام

Rx:

Balkis Syrup مزيل لاحتقان الأنف (يوقف انسداد الأنف) والرشح ملعقة صغيرة صباحاً ومساءً



Abimol Syrup (like pyral) ملعقة صغيرة ٣ مرات يومياً يخفض الحرارة


Rx:

Coughseed children supp لبوس شرجی ۳ مرات إذا كاتت نزلة البرد مصاحبة بكحة Dr I Rasha Hany









نظام غذائسي لمريض القولون العصبي والانتفاخ

الإفطار:

كوب لبن أو بليلة (اللبن غير مستحب عند البعض)
بيضتان مسلوقتان أو جبن أو طبق صغير فول مصفي
خبز أبيض أو توست
كوب خفيف جداً من الشاي

الغذاء:


أرز أو مكرونة أو شعرية + لحم مسلوق أو مشوي أو سمك مشوي أو سبانخ أو قلقاس خبز أبيض أو توست

بطاطس مهروسة أو كوسة مسلوقة + تفاح أو عنب أو برتقال أو تيزأو مشمش

الساعة الرابعة بعد الظهر: بسكويت أو كيك

العشاء:

ارز بلبن + مهلبية أو جيلي أو عسل نحل أو بطاطس مهروسة - بقدونس - خس



روشتة لإصابة الأظافر بالفطريات

> Nail Fungal Infection

Lamisil tab	قرص واحد يومياً لمدة 1 ؛ يوم _ يكرر كل شهر _	
	لمدة ٣ شهور	
Trosyd nail solution	يوضع مرتين يوميا لمدة ٦ شهور	Strong solution for
		nail yeast infection



Dr / Rasha Hany

Fucidin cream sshould be added if there is Bacterial infection.




Eye Congestion

روشتة لاحتقان العين نتيجة الإرهاق والقراءة ومشاهدة التليفزيون والحسساسية

R/ Visine AC drops (one drop 3-4 times daily)

فايزين يجب استعماله بصورة متقطعة وليس بصورة متواصلة لان استخدامه نقترات طويلة يؤدي إلى عدم المقدرة على الاستغناء عنه لاحتوائه على كورتيزون

Dr / Rasha Hany



runny nose

Fever (usually lasts 3 to 5 days)

body aches

Fatigue

Cough (may last 2 wks or more)

روشتة للبرد والأنفلونزا common cold & influenza

R / Clarinase

> قرص 3 مرا<mark>ت حتى تتوقف الأعراض</mark> it is antihistamine

Vitacid Calcium

كيس في نصف كوب مرة يومياً فيتامين سي يقوي المناعة والكالسيوم يقلل الألم

Flumox 500 cap
كبسولة كل 8 ساعات بعد الأكل
يحمي من حدوث مضاعفات

Dr/Mido





* symptoms of allergy Flushing Itching , Skin allergy runny nose bronchospam & cough روشتة للكحة المصاحبة لبلغم الناتجة عن حساسية

Wet Allergic cough

R /
Mucophylline syrup

ملعتة 3 مرات يومياً بعد الأكل

Telfast 180 tab قرص يومياً بعد الأكل

Vendexine Syrup 10مل مرتين بعد الأكل لمدة 3 أيام

Dr / Mido



فاتح الشهية للأطفال Appetizers for Kids

Dr I Rasha Hany

Rx: TresOrix Syrup

5 ml 1 hr before meals


Multi-Sanostol Syrup

5 ml 1-2 times daily after food.

- * This prescribtion is Important for those kids usually taking unbalanced or insufficent meals or nutrition.
- * During the teething period , the children should take Ca+ & Vit D Syrup like (D-cal B12 or Visol calcium) .







طعام جميع مرضي الكيد

-بدوز_ ملح

-الامتعاضة عز الملح بالكعون والليعون

تناول الأطعمة اللينة والطرية وتجنب الأطعمة الخشنة التي_

قد تخدش المرى مثل الخبز الجاف

- أطعمة تحتوي فيتامين ك (كالخس والسبانخ والبروكلي والخضروات)

- تناول بيض مسلوق (البياض فقط) وعسل نحل باعتدال في الإفطار

-عدم تناول الشاي الثّقيل والقهوة والماء والعصائر المثلجة والسوائل شديدة السخونة للحفاظ على المرى والمعدة.

-عدم تناول الحريفات كالفلفل الأسود والشطة والمخلل

-الابتعاد عن الأطعمة التي تهيج المرى مثل المشعش والتعرالهندي والكركديه وعصير الطعاطم

-ينصح بأطعمة تحتوي الحديد (العسل الإسود - الكبدة - اللوبيا) بعد النزيف.

ط/على السيد سلام



R/

food

روشتة لعلاج الإسهال لدى البالغين due to Amoebiais or Giardia R/كبسولة ٣ مرات يوميا حتى توقف الاسهال Immodium caps (Immodium such as Lopodium or lomotil caps) R/قرص ٣ مرات يومياً /أسبوع Furazol tab R/

عند الشعور بالمغض Buscopan one tab 3 times before

كيسولة ٣ مرات يوميا Antinal caps إذا كان الإسهال مصاحب بارتفاع درجة الحرارة Bacterial gastroenteritis watery stool + Nausea + Vomiting + Abd pain RIIM or SC primpran to stop Nausea & vomiting then ttt كيسولة ٣ مرات يومياً بعد الأكل

* Antinal caps قرص مرتين يومياً بعد الأكل (كل ١٢ ساعة) * Septrin D.S tab Dr/ Ali Sallam



R/

Epinephrine amps (Adrenaline) ينرغ أمبول على تطعة تطن ويوضع داخل الأنف التي تنزف لدتائق

R/Otrivin nasal spray بخة ٣مرات يومياً لمدة يوم واحد

R/Dafrex 500 tab قرصين صباحاً ومساءً في حالة تكرار النزيف روشتة لعلاج نزيف الأنف Epistaxis

Patient should avoid Sniffing or blowing his nose for several hours after anosebleed.

Tray the first Aid as demonstrated above for at least 5 minutes , usually it is sufficent to stop Epistaxis.



Hypercholesterolemia الكوليستيرولي Chronic Cholecystitis

الأطعمة الممنوعة :

١-المقليات

(البرجر - البطاطس - الباذنجان - الطعمية - . .)

٧- تجنب الدهوز واللحوم الدسمة.

٣- تجنب الشوكولا والمكسرات وصفار البيض واللبن كامل الدسم والجبن الدسم والقشدة والزبدة.

الأطعمة المسعوحة:


١-الأرز وزيت الزيتون وزيت عباد الشمس وزيت الذرة . . والإكثار من الخضروات والفواكه.

٧-بياض البيض واللبن خالب الدسم والجبن القريش.

طريقة فعالة: تقسيم ليمونة إلى أربع أقسام ووضعها في برطمان ماء مغلي به كمون

وشربها عندما تبرد.

ط/على السيد سلام



- * OM Symptoms are Earache + Fever + usually bad odour ear discharge.
- *There is acute otitis media (AOM):in which there is discharge inside the ear & part of the ear is infected & Swollen ,, and There is otitis media with effusion (OME), discharge remain after the infection is over

روشتة لعدوى الأذن الوسطى

otitis media

Antibitotic Capsules

Bacticlor Caps.

کبسولة کل 8 ساعات / 7-1 أیام

Analgesic Ear drops

otosept مرات/یوم 3 قطرة 3مرات/یوم

also Cephalosporins are effective in OM every 8 hrs (cefardoxil) & Also Quinolones are effective every 12 hrs like (Ciprofloxacin)


Dr / Abd-Ulrahman Hamid



من أسباب الزغطة الشهيرة قرحة المعدة Peptic ulcer أو Gastritis So You should ttt peptic ulcer

من المهم سؤال مريض الزغطة التي لا تتوقف عما إذا كان أخذ حقن كورتيزون طويلة المفعول Corticosteroids oral for long time or long acting inj may lead to Severe gastritis & in turn Hiccup so CS should be stopped gradually and Rantidine should be added to relief gastritis.

Dr/ Ali Sallam



runny nose

Fever (usually lasts 3 to 5 days)

body aches

Fatigue

Cough (may last 2 wks or more)

روشتة للبرد والأنفلونزا common cold & influenza

R / Clarinase

> قرص 3 مرات حتى تتوقف الأعراض it is antihistamine

Vitacid Calcium كيس في نصف كوب مرة يوميأ فيتامين سي يقوي المناعة والكالسيوم يقلل الألم

Flumox 500 cap كبسولة كل 8 ساعات بعد الأكل يحمي من حدوث مضاعفات

Dr/Mido



R /

Daflon 500 mg tab

قرصین صباحاً ومساءً لشهر-شهرین

R/
Proctoglyvenol supp.


لبوسة بعد التبرز مرة يومياً

R/
Neohemorrhan cram
کریم شرجی یومیاً بعد التبرز

+ Minalax for constipation one tab before bed time

If the 4th degree patient is in a good health, surgery is the best solution...

Ptient should avoid constipation as it deteriorates the piles.




هراحل او درجات البواسير الذاخلية









Piles come out during defecation & Can be reduced



Piles come out but can't be reduced

التبول اللإرادي عند الأطفال Pediatric Nocturnal Enuresis





Dr I Rasha Hany

Rx: Uripan Syrup Or Detronin


2.5-5 ml 2 times daily (at noon & night)

Contains Oxybutenin, inhibits urinary tract contraction (antispasmodic & antimuscarinic effect)

Psychological treatment

No punishment is a part of Therapy as High ratio of Enuresis is Psychological due to family troubles (Variation between brothers), but exclude pathological causes (UTI "prostatitis in male" & anatomical anomalies)

Avoid drinking water 1 hr before bed time Avoid diuretic drinking (tea & Coffe)




for the best result of weight loss the patient should reduce the fat content of the food, also reduce daily sugar and carbohydrate intake.

Daily walking & running for 1/2 to 1 hour is highly recommended.

Bran is natural and safe.

روشتة تساعد على التخسيس Slimming

R/



Seortim capsules

قرص واحد قبل الأكل بساعة مرة -مرتين يومياً


Bran tab

3 أقراص قبل الأكل بساعة مرتين- ٣ مرات يومياً

Multivitamin cap

كبسولة واحدة بعد الأكل يوميأ

Dr / Rasha Hany



طعام مريض الغيبوية الكبدية والكلي

بدون ملح

بدون بروتين (لا للجبن والبيض والألبان واللحوم والفراخ والسمك)

الطعام بكون عبارة عن بطاطس مهروسة أو جبنة قريش

في الفطار والعشاء


+ أي خضار غير مسبك وأرز بدون ملح في الغذاء

+ عسل نحل ومربى + خضروات وفاكهة مغذية مثل التفاح الأصفر

+ عصائر طبيعية بدون مواد حافظة

ط/على السيد سلام

Ringworm



التينيا من الأمراض العنيدة لذلك يجب استخدام أكثر من مضاد فطري في أن واحد كما في الروشتة لنكون أكثر فاعلية في القضاء على التينيا.


Dr / Rasha Hany

روشتة لعلاج التينيا الجلدية Tinea



Sulpher Soap	تدليك شديد للمكان المصاب بالصابونة	Sulpher has good activity.
Dakartin cream	دهان بعد ا <u>نصابونة</u> مرتين يوميا	Miconazole
Candistan solution	يوضع مرتين يوميا نمدة أسبوعين	Clotrimzole
Nizoral Shampoo	يمسح به الجلد بشدة لمدة عشر دقائق ثم يغسل الجلد ويحفف	Ketoconazole
ultragriseofulvin	قرص مرتين يوميا لمدة شهرين	Like ultravulvin, antifungal antibiotic in infections caused by various species of epidermophyton , microsporum and trichophyton.





Dr / Rasha Hany


روشتة لقشرة الشعر Dandruff

R /
Nizapex Shampoo

يفرك الشامبو في الشعر بعد غسيله لمدة خمس
دقائق مرتين أسبوعياً

Rootage Cream یوضع یوم بعد یوم

many researches say that the main cause of Dndruff is fungal, and No antidandruff product can eradicate dandruff till now But Nizapex contain Ketoconazole with good antifungal antidandruff properteis.



روشته لعلاج البلمارسيا


Destocide tab

Mirazid tab

40مجم / كم من الجسم تؤخد كجرعة















Abdominal Colic & Distension in Babies المغص والانتفاخ عند الرضع

Rx:

Gripe water

ملي (نصف ملعقة صغيرة) ٣-٤ مرات يومياً
يزيل الانتفاخ والمغص

Dr / Rasha Hany

Rx: Semithicone drops انقط ۱-۳ مرات يومياً في حالة وجود غازات وانتفاخ

Rx:
Spasmotal drops (Buscopan drops)

ا نقط ٣ مرات يومياً حتى زوال الألم
مضاد للتقلصات في الرضع



* symptoms of allergy
Flushing
Itching , Skin allergy
runny nose
bronchospam & cough

روشتة للكحة المصاحبة لبلغم الناتجة عن حساسية

Wet Allergic cough

R /

Mucophylline syrup

ملعتة 3 مرات يومياً بعد الأكل

Telfast 180 tab قرص يومياً بعد الأكل

Vendexine Syrup 10مل مرتين بعد الأكل لمدة 3 أيام

Dr / Mido



for TTT of anal fissure

روشته لعلاج الشق الفرجي

Avoid constipation

Minalax tab


or

Laxeol tab

or

Glycerine supp

مرتين يوميا







Sediproct supp or cream or

Proctosedyl supp or cream

or

Proctoglyvinol supp or cream







لبوس او کریم شرجی مرتبی یومیا

Several lifestyle changes may help relieve discomfort and promote healing of an anal fissure, as well as prevent recurrences:

Add fiber to your diet ,Drink adequate fluids ,Exercise regularly ,Avoid straining during bowel movements

Surgery:

If you have a chronic anal fissure that is resistant to other treatments, or if your symptoms are severe, your doctor may recommend surgery. Surgery usually involves cutting a small portion of the anal sphincter muscle to reduce spasm and pain and promote healing. Surgery has a small risk of causing incontinence

R /

Daflon 500 mg tab

قرصین صباحاً ومساءً لشهر-شهرین

R/
Proctoglyvenol supp.


لبوسة بعد التبرز مرة يومياً

R/
Neohemorrhan cram
کریم شرجی یومیاً بعد التبرز

+ Minalax for constipation one tab before bed time

If the 4th degree patient is in a good health, surgery is the best solution...

Ptient should avoid constipation as it deteriorates the piles.



هراحل او درجات البواسير الذاخلية










Piles come out during defecation & Can be reduced



Piles come out but can't be reduced



نصائح لمريض هشاشة العظام

شرب اللبز

+ أكل الجبن والبروتين النباتي

مثل البقوليات.


+الابتعاد عز البروتين الحيواني حيث أنه يخرج الكالسيوم في البول

أكل الموز والكنة الوب مفيد

ممارسة رماضة المشي بانتظام

تجنب تناول الاملاح لأنها تخرج الكالسيوم في البول

الابتعاد عز التدخين



Hypercholesterolemia الكوليستيرولي Chronic Cholecystitis

الأطعمة الممنوعة :

١-المقليات

(البرجر - البطاطس - الباذنجان - الطعمية - . .)

٧- تجنب الدهوز واللحوم الدسمة.

٣- تجنب الشوكولا والمكسرات وصفار البيض واللبن كامل الدسم والجبن الدسم والقشدة والزبدة.

الأطعمة المسموحة:

١-الأرز وزيت الزيتون وزيت عباد الشمس وزيت الذرة . . والإكثار من الخضروات والفواكه .

٢-بياض البيض واللبن خالم الدسم والجبن القريش.

طريقة فعالة: تقسيم ليمونة إلى أربع أقسام ووضعها في برطمان ماء مغلي به كمون

وشربها عندما تبرد.

ط/على السيد سلام

روشته لعلاج الام العضلات

for TTT of ms aches

myolgin tab or

myorelax tab

or

or

or

myofen tab

moov cream

reparil gel

flector gel

فرص ٣ مراه يوميا











Flector' gel

Prevention

Warm up before exercising and cool down afterward. Stretch before and after exercising.

Drink lots of fluids before, during, and after exercise.

If you work in the same position most of the day (like sitting at a computer), stretch at least every hour.



روشتة للحروق Burns

Betadine antiseptic Solution	تنتظیف یمکن آن یستخدم بدون تخفیف	Broad spectrum antiseptic
Dermazine cream	يوضع مرتين يوميا	Contain Sliver-sulphadizaine (antibacterial for variable dgrees of burn)
Sofratuli Gauz	شاش يوضع على المنطقة المحروقة مرة يومياً بعد الكريم	Contain sodium Fusidate
Ibidroxil 500 cap	كبسوئة كل ٨ سناعات حتى الانتفام	Contain cephadroxil
Mebo cream		Contain Collagenase Enzyme promote healing

Dr / Rasha Hany



the above prescribtion suitable for 1st and 2nd degrees of burn, (where the skin is not removed completely)

5 steps must be done for severe cases of burn,

- 1-deliver the patient to hospital
- 2- remove clothes Fix cannula (to give IV Ringer & Saline)
- 3-Antihistamine amp (Avil) + corticosteroid (epidron) + tetanus toxoid (do allergic test)
- 4-Analgesic injection (Voltarin)+anticoagulant
- 5-Eye drops or ointment (terramycin or apigent)

روشته لعلاج عدوى الاظافر الفطرية

for TTT of Onychomycosis

trosyd nail solution 28% دهان مرتين يوميا على الاظافر المصابة لمده ٦ اشهر

Terbin tab

لعدوى اظافر اليد :قرص مره واحده يوميا لمده ٢ اسابيم لعدوى اظافر القدم :قرص مره واحده يوميا لمده ١٢ اسبوع

Itranox caps

قرصين مرتين يوميا لمد اسبوع ثم ٣ اسابيع راحه ثم قرصین مرتین لمده اسبوع ثم ۳ اسابیع راحه في اصابه اظافر اليد ويزاد مره ثالثه بنفس السياق في حاله اظافر القدم

OF

10

Flucoral 150 mg caps (not currently labeled by the FDA, but early efficacy data are promising.)

ثلاثه اقراص (٥٠٠ مجد)مره واحده في الاسبوع لمده ٣ اشهر

Surgery. If your nail infection is severe or extremely painful, your doctor may suggest removing your nail. A new nail will usually grow in its place, though it will come in slowly and may take as long as a year to grow back completely. Sometimes surgery is used in combination with trosyd to treat the nail bed

Treating nail fungus with a laser or photodynamic therapy — intense light irradiates the nail after it's been treated with an acid - may also be successful. However, this new treatment may not be available everywhere.

to help prevent nail fungus and reduce recurrent infections, practice good hand and foot hygiene.

1- Keep your nails short, dry and clean.

2. Trim nails straight across and file down thickened areas. Thoroughly dry your hands and feet, including between your toes, after bathing.

3. Wear appropriate socks. Synthetic socks that wick away moisture may keep your feet dryer than do cotton or woel socks iyou can also wear synthetic socks underneath other socks). Change them often, especially if your feet sweat excessively.

Take your shoes off occasionally during the day and after exercise.

Alternate closed toe shoes with open toe shoes.

6 Use an antifungal spray or powder. Spray or sprinkle your feet and the insides of

7. Wear rubber gloves. This protects your hands from overexposure to water.

8. Don't trim or pick at the skin around your nails. This may give germs access to your skin and nails.

9. Don't go barefoot in public places. Wear shoes around public pools, showers and locker rooms.

10. Give up nail polish and artificial nails. Although it may be tempting to hide nail fungal infections under a coat of pretty pink polish, this can trap unwanted moisture and worsen the infection.

11-Wash your hands after touching an infected nail. Nail fungus can spread from nail to nail.



TROSYD

ANTIFICACION.







روشته لعلاج التهاب الجيوب الانفيه الحاد for TTT of acute sinusitis

augmentin or curam or hibiotic 625 mg قرص ۲ مرات يوميا لعدة ١٠ ايام

دركن الدراك يوسي فعد ١٠ ايام

clarinase or claritine or histazine tab قرص يوميا

congestal or cometrex or nova c tab

قرص ۲ مرات يوميا

otrovin or afrin nasal drops نقط في الانف مرتين يوميا

ولا تستخدم لاكثر من ٥ ايام

alka misr sachets

كيس على نص كوب ماء ويستنشق

mucolytic if needed

- Acc 200mg eff

قرص فوار على تص كوب ماء ٢ مرات

نوميا

Rinse out your nasal passages, called nasal lavage باستخدام سرنجة (بدون السن طبعاً) باستخدام ماء دافيء this can help clear sinus.

Drink plenty of fluids ويسهل خروجه mucous لل dilution لكي نعمل ويتجنب الشاي و القهوة حيث لها dehydrating effect

Steam your sinus cavities عن طريق استشاق بخار الماء الساخن أو having hot shower أيضا يسهل ال draining of mucous


Apply warm compresses to your face عمل كمادات دافئة على الوجه لتقليل الألم







HEALTHY SINUS



R/


Epinephrine amps (Adrenaline) ينرغ أمبول على تطعة تطن ويوضع داخل الأنف التي تنزف لدتائق

R/Otrivin nasal spray بخة ٣مرات يومياً لمدة يوم واحد

R/Dafrex 500 tab قرصين صباحاً ومساءً في حالة تكرار النزيف روشتة لعلاج نزيف الأنف Epistaxis

Patient should avoid Sniffing or blowing his nose for several hours after anosebleed.

Tray the first Aid as demonstrated above for at least 5 minutes , usually it is sufficent to stop Epistaxis.



طعام مريض قرحة المعدة Peptic Ulcer

اللبن - منتجات الألبان (الزبادي) - بيض مسلوق - أسماك خضار مسلوق (بسلة - فاصوليا - جزر - قرنبيط) + أرز

كيفية تناول الأكل ؟؟؟؟

١-تناول الوجبات الثلاثة بانتظام

 ٢-تثاول وجبات صغیرة بین الوجبات الرئیسة (جیلی - مهلبیة زیادی - کیك - بسكوت)

٣- تجنب تناول الطعام ساخن أو بارد.

٤- عدم الثوم بعد الأكل مباشرة وعدم الأكل بسرعة

٥-تناول كميات جيدة من الماء

يفضل الفاكهة الغير حمضية مثل: تفاح - تين - تمر - فراولة - عنب - كمثرى


نجنب الفاكهة الحمضية مثل: البرتقال - الليمون -اليوسفي - جريب فروت - مشمش - برقوق - أثاثاس تجنب الشاي والقهوة والمشروبات الغازية والحلويات الدسمة.

نجنب البهارات والمقليات (الطعمية-الباذنجان-البطاطس-.....) واللب والمكسرات والأملاح (جبن رومي -....) والليمون والدهون والخل والملوخية والسبانخ والبقدونس

ممنوع منعأ باتأ الأسبرين وأدوية الروماتيزم والتدخين

عدم ارتداء ملابس ضيقة على منطقة البطن

ط/على السيد سلام



تصانح لريض حصوات الكلي Renal Stones

- تجنب اللحوم والبروتينات.

- تجنب الأطعمة التي تحتوي على أوكزالات مل السيانخ والطماطم والشوكولا والفول السوداني والمكسرات والبقوليات الخضراء والفراولة والتفاح و الشاي والقهوة والكولا.

- تجنب اللبن والبيض والأطعمة المحتوية على كالسيوم.

- تناول أطعمة قليلة الملح .

- الإكثار من شوب الماء

ط/على السيد سلام

روشته لعلاج خشونه المفاصل لكبار for TTT OF osteoarthritis

Dorofen tab

قرص كل ٨ ساعات بعد الاكل لمده ٦ شهور

Piascaldine tab

قرص وسط الغداء يوميا لمدد ٦ شهور

Olfen 75 DA tab

قرص کل ۱۲ ساعه بومیا



PLASCLEDINE 300

Milga tab

فرص يوميا



Zantac 150mg tab

قرص قبل الاكل بربع ساعه كل ١٢ ساعه

or


Omez 20mg tab

قرص قبل الاكل بساعه كل ١٢ ساعه

if ptn suffer from Gastritis

lifestyle changes may delay or limit osteoarthritis symptoms.


- 1- Weight loss
- 2- Exercise: Regular exercise may help to strengthen the muscles and potentially stimulate cartilage growth. Avoid high-impact sports. The following types of exercise are recommended: range of motion, strengthening, and aerobic.
- Diet: Antioxidant vitamins C and E may provide some protection. Vitamin D and calcium are recommended for strong bones.
- 4- Heat: Hot soaks and warm wax (paraffin) application may relieve pain.
- 5- Arthritis self-help course: The Arthritis Foundation offers an educational program on the causes and treatment of arthritis. Exercise, nutrition, relaxation, and pain management programs are covered as we as ways to communicate with your doctor. For some, completion of the program reduced pain by 20% and doctor visits by 40%.
















شراب فعال لعلاج الكحة و مذيب قوى للبلغم، مناسب لجميع الاعمار بداية من عمر يوم واحد امن مع مرضى الضغط و السكر والقلب والكبد والكلى وغير مسجل كمكمل غذائي السعر ٩٠٥٠ ج ١٢٠ مل


كبسولات سريعة المفعول تستعمل لعلاج حموضة المعدة و الاثنى عشر، يتميز عن الادوية المعتادة باضافة صوديوم بيكربونات الي الاوم يبرازول، مما اضاف له مميزات اخرى لم تتواجد في الادوية المعتادة لعلاج الحموضة مثل سرعة

> الإمتصاص والتحكم في زيادة افراز الحمض اثناء النوم

> > السعر ١٥ ج

دی-حار

اقراص سريعة التفتت تمتص من على اللسان مباشرة تتميز بسرعة المفعول، لا يسبب النعاس الجرعة مرة واحدة يوميا



السعر ١٠ ج دیسلوراتادین ه مجم

للتحكم في حساسية الجلد (حكة الجلد - الارتيكاريا)، كما يستعمل لعلاج الاعراض المصاحبة لحساسية الانف،

ديسلوراستامين

شراب مضاد للحساسية لايسبب

النعاس، يستعمل مرة واحدة يوميا

مثل العطس ورشح Deslorastamine الانف وحكة واحمرار العين السعر ٨ ج ١٢٠ مل بنكهة البرتقال

(دیسلوراتدین ه. مجم/۱مل)

ROXOGESIC

روكسوچيسك

روكسوجيسيك

مسكن قوى سريع المفعول و خافض للحرارة، ذو تاثير لطيف على المعدة، يبدأ تأثيره المسكن في خلال ١٥ دقيقة يمكن تناوله قبل او بعد الاكل، يستعمل ٣ مرات يوميا

> سعر الشريط ٨ ج لوكسوبروفين صوديوم ٦٠ مجم



سبازاوای اقراص سريعة المفعول لعلاج آلام المغص تمتص من تحت اللسان مباشرة كما يمكن ابتلاعها، يستعمل كدواء مساعد في تخفيف الام المغص الكلوى و المغص المرارى و آلام الدورة الشهرية والقولون العصبى المزمن

Omehealth

سعر الشريط ٣.٥ ج هیوسیامین ۱۲۵.۰ مجم







Tonsilitis or Throat infections

التهاب اللوز والحنجرة


Rx: Flumox 250 susp.

مضاد حيوي ملي (نصف ملعقة صغيرة) كل ٨ ساعات لمدة أسبوع

Rx: Brufen Susp. خافض للحرارة ملي كل ٨ ساعات

Tonsilitis
usually accompanied
with high fever,
difficulty in swallowing &
enlarged pharynx ...
may be masked
(without fever)

Dr I Rasha Hany



for the best result of weight loss the patient should reduce the fat content of the food, also reduce daily sugar and carbohydrate intake.

Daily walking & running for 1/2 to 1 hour is highly recommended.

Bran is natural and safe.

روشتة تساعد على التخسيس Slimming

R/

روشار كسان

orly tab

قرص مرتین ل۳ مرات یومیا

Bran tab

3 أقراص قبل الأكل بساعة مرتين- ٣ مرات يومياً

Multivitamin cap

كبسولة واحدة بعد الأكل يوميأ

Dr / Rasha Hany





Chronic Bronchitis Smoker's lung

If you smoke: QUIT!
It is never too late

You cough alot + Thick sputum difficult to cough up روشت<mark>ة للنزلة الشعبية المزمنة</mark> Chronic Bronchtis

₹/

flumox 500 mg
كبسولة 3 مرات لمدة خمس أيام
مضاد حيوي

* Aironyl Syrup ملعنة كبيرة 3مرات يوميأحتى الشناء bronchodilator

*

Bronchophan syrup ملعنة كبيرة 3 مرات

acts as cough suppressant , decongestant , antihistaminic & mucolytic

Dr / Mido



روشتة لعلاج حب الشباب Acne

R I Sacnel Soap

يستعمل ويحك برفق على الوجه لمدة خمس دقائق ثم يشطف بالماء

Erytin gel (Antibacterial + tretinoin "vit A")

يدهن مساءً تمدة شهر

Vibramycin capsules (doxycilline)

كيسولة يوميا لمدة ١٠ أيام

** The patient should not be exposed to sun after application of any acne preparation to avoid any skin inflammation.

روشته لعلاج الهربس

FOR TTT OF Herpes simplex_{HSV1.7}

R/ ACYCLOVIR CREAM OR ACYCLOSTAD CREAM OR

ZOVIREX CREAM

دهان كل ٦ ساعات على المكان المصاب



if sever or immunocompromised patients zovirex 400 tab

zovirex 400 tab قرص ۳ مرات پومیا

if secondry infected hiconcil tab 500 mg

فرص **آمرات** يوميا

garamycin cream دهان مرتین یومیا

N.B COTICOSTERIOD is contraindicated Genital Herpes: Treatment of Initial Genital Herpes: 200 mg every 4 hours, 5 times daily for 10 days.




روشته لعلاج الامراض الوعائيه الطرفيه for TTT of periphral vascular disease

Trental 400mg SR tab قرص ٣ مرات يوميا بعد الاكل

Pletaal tab قرص مرتين بوميا قبل الاكل بساعه

Aspocid ped chewable tab قرص للمضغ مره واحده بعد الاكل



if ptn suffer from hyperlipidemia Ator 10mg

قرص مره واحده يوميا

Smoking cessation eliminates a major risk factor for disease progression and lowers the incidences of rest pain and need for amputations. Smoking cessation is also important for the prevention of heart attacks and strokes.

A healthy diet can help lower blood cholesterol and other lipid levels and may help control blood pressure.

Keep other risk factors, such as diabetes, lipid levels, and blood pressure under control by following medical advice regarding medications and lifestyle change

Supervised exercise

Proper exercise can condition the muscles to use oxygen effectively and can speed the development of collateral circulation.

N.B no improvement before 2 weeks











روشنة لعلاج الجرب Scabies

Sulpher Soap	صابونة يغسل بها الجسم كله بالماء الدافئ	Sulpher has good activity against scabies.
Eurax lotion	دهان للجسم ماعدا الرأس والوجه مرة يوميا ل ٣ أيام	Contain Crotamiton eradicate scabies after 3 days of treatment

بالرغم من سهولة علاج مرض الجرب إلا أن العدوى به سهلة لذلك يجب عدم لبس ملابس المصاب أو لمسه أو النوم بجواره حتى تنتهي مدة العلاج ،، ويجب تغيير الملابس ومفرش السرير وغليهم كل مرة بعد الدهان لمنع استمرار العدوى أو رجوعها.



Dr / Rasha Hany

روشته علاج الكدمات والجروح الناتجه عن الحوادث

for TTT of bruises & wounds

Analgesic for pain, inflammation

- + excess protein removers
- antibiotic to avoid infection

وبالتالى الروشتة تحتوى على هذه الادوية على سبيل المثال

cataflam 50 mg tab قرص مرتين بعد الاكل alphintern or ambeziem tab قرص قبل الاكل بنص ساعه ٣مرات يوميا curam 625 mg tab











قرص ٣ مرات يوميا

- hemoclar or reparil gel or alpha kadol cream دهان للکدمات ۴مرات یومیا









روشتة لعلاج الإمساك عند البالغين Constipation

R/

** Minalax tab

(1-2 tabs Before bed time)

** Nu-Spasm tab (Buscopan)

(1-2 tabs if there is a colic)

لمنع التقلصات المصاحبة

Most laxatives are contraindicated during pregnancy & Lactation.

Patient Education:

*Drink 8 glasses of Water each day.

* High Fiber Food (Whole grain breeds, Cereals and rice)

(Fresh fruits except for banana)


(Vegetables except for potatoes)

(Dried Fruits: Prunes, apricots & Figs)

(Legumes: Chick peas, backed beans, lima beans & Soya beans)

Dr/ Ali Sallam

^{*} try to limit stress on your life



نصائح لريض القولون العصبي والانتفاخ

الامتناع عن الأطعمة السببة للانتفاخ مثل

القليات في الزيوت (الطعمية- الباذنجان- السمك-البطاطس)

اللحوم السمينة (البط - الحمام -الضأن-الكبد-...) البصل والخضار المسبك و القشدة والكريمة بعض الفواكة (المانجو-الجوافة-التين-المشمش-

البطيخ)

الحوادق: الفسيخ -الرنجة-الطرشي-الزيتون-الجبن شديد اللوحة-الأسماك المحفوظة

الحوارق: القلقل - الشطة

عدم الأكل بسرعة وعدم شرب الماء أثناء الأكل


عدم شرب البيبسي والقهوة والشاي والعلبات

توزيع الطعام على عدة وجبات صغيرة خلال اليوم بدلاً من ٣ وجبات

شرب لتر ونصف إلى لترين ماء

تجنب الضغط النفسي والتوتر

ط/ على السيد سادم



Check your Reduce risk factors alcohol fosamax 10 mg tab

قرص مره يوميا قبل الاكل بساعتين على معده فارغه

مع عدم اخذ اك ادويه خلال نص ساعه من اخذ الدواء وتجنب النوم او الاستلقاء خلال هذه الغتره

One Alpha .5 mcg قرص يوميا بعد الاكل

Oscal tab قرص يوميا بعد الاكل

N.B miaclacic amp (calcitonin)

better avoided >>>>

long term use lead to bone cancer

hormon replacement theraby >>>>

long term use lead to breast cancer thus the long term risks are greater than benefits.

decaduraboline >>>now not recommended

Prevention at home to avoid falls and hip fracture among elderly:

Lighting should not be too dim or too direct, and light switches should be accessible.

Carpets and rugs should be tacked down.

Bathrooms should have a chair for bathing or skid-resistant mats,

grab bars should be placed where needed and the toilet seat needs to

be tall enough for easy transferring.

Chairs need to be stable (without wheels) and have arm rests. Kitchen items that are frequently used should be at waist level or on

low shelves, a rubber mat should be placed in front of the sink and non-slip wax should be used on the floor.

Stairways need handrails and steps should not be slippery.

Lifestyle changes:

Smoking cessation. Decrease or eliminate alcohol consumption.

Exercise

Physiotherapy: gentle mobilization and massage therapy to relieve musculoskeletal issues. Extension mobilization of the thoracic spine may offer benefit.





Good sources of vitamin D



buterinargarine

fortified milk







Good sources of calcium







ez plain yegurt = 450 mg




= 1300 n





8 oz. orange



روشته لعلاج زیاده املاح الیوریا For ttt of hyperuricemia

R/
Urosolvine eff. packets (contains colchicine)
باکو فی نصف کوب ماء ۳ مرات یومیا

No-Uric 100 mg tablets قرص ٣مرات يوميا بعد الأكل

يجب تجنب اللحوم والقهوة والشاي والكولا والبقوليات

في الحالات الشديدة يُعطى مسكن ومضاد للالتهاب مثل ديكلوفيناك الصوديوم ٥٠ مجم ٣ مرات يومياً بعد الأكل





dr.R.H

لعلج حماسية العين for ttt of eye allergy

prisoline E.D or Visine E.D or Occumethyl E.D

خطره ٣ مرات يوميا

Isoptofrin E.D

Do not use more often or continuously for longer than 5days

Do not use if you have glaucoma

Do not use after eye surgery

Do not use during pregnancy





To apply the eyedrops: Tilt the head back slightly and pull down on the lower eyelid. Position the dropper above the eye. Look up and away from the dropper. Squeeze out a drop and close the eye. Apply gentle pressure to the inside corner of the eye (near the nose) for about 1 minute to prevent the liquid from draining down the tear duct. Repeat the process in the other eye if needed

Vaginal fungal infection:

Flucoral 150mg كبسولة اسبوعيا لمدة اسبوعبن

Betadine vaginal douch کیس علی لتر ماء مرتین

ة Gynotrosyd vaginal supp مرات يوميا 3











Rx /
Ditropan (1x3)
قرص کل ۸ ساعات

Or

Rx / Minrin tab

Dr | Ali Sallam

ينصح بعدم إيقاف الدواء دون استشارة الطبيب For ttt of Tania Saginate, T. Solium, Diphyllobothrium latum and Hymenolepiasis nana.

الدوده الشريطيه

Yomesan


أقراص للمضغ تمضغ جيدا ثم تبلع بالماء في اليوم الأول أربع أقراص مرة واحدة ثم قرصين يوميا لمدة أسبوع

laxel EFF

كيس على نصف كوب ماء ٣ مرات يوميا لمنع الامساك والتخلص من الديدان الميته







روشتة لعلاج قمل الرأس Lice



Licid Lotion

tetramethrin بماء وشامبو ثم يجب تسريحه بعد ذلك بالمشط لإزالة القمل

Contain Contain بخاخ للرأس يترك premethrin or

Dr / Rasha Hany





روشتة لرائحة الفم الكريهة

Bad odour due to mouth soft tissue infection

R/

Betadine mouth Wash

(gargle for 3 minutes/8 hrs)

Vibramycin cap.

(one cap. daily for 5-10 days)

Amirzole 250 mg tab.

(one tab. 3 times daily after food)

Dr/Abd-Ulrahman Hamid

FOR TTT OF OXALATE STONES

روشته لعلاج زياده املاح الاوكسالات

Epimag eff or

citrocid mag eff

كيس على نص كوب ماء ٣مرات يوميا

تجنب تناول الاطعمه المحتويه على الاوكسالات كالماتجو والطماطم والجوافه وغيرها


مع المحافظه على شرب كميات اكبر من الماء يوميا B6 الاكثار من تثاول الاطعمه الغنيه بفيتامين

: مصادره الطبيعية

القواكه على اختلاف اثواعها - جنين الحبوب وخاصة القمح والذره -قشرة الأرز - القول - القاصوليا - السيانخ - قصب السكر -

: مصادره الحيوانية

. الكبد - الكلى - اللحوم - اللبن - مح (صفار) البيض











Otitis media in children روشتة لعدوى الأذن الوسطى في الأطفال

Rx: Duricef 250

ه ملي (نصف معلقة) كل ٨ ساعات لمدة ٧ أيام مضاد حيوى واسع الانتشار

Rx : Apigent ear drops

قطرة قطرتين ٣ مرات يومياً لمدة ٧ أيام إذا كاتت العدوى مصاحبة بالتهاب مضاد حيوى

Rx: Earcure ear drops or Otocalm فَطْرِةً-فَطْرِتَينَ ٣ مِراتَ يُومِياً لَمَدَةٌ ٧ أَيَام


مسكن

Rx : Voltaren 12.5 & 25 supp.

لبوس کل ۱۲ ساعة حتوي على ديكلوفيناك وهو مسكن قوي Dr I Rasha Hany







Peptic ulcer and Helicobacter pylori



روشتة لقرحة المعدة نتيجة بكتيريا هليوباكتر بيلوري

R/ Ompepack cap كبسولة قبل العشاء يومياً for 2-4 weeks

Klacid 500 mg قرص كل 12 ساعة بعد الأكل for 2 weeks

Flagyl 500 mg قرص كل 12 ساعة بعد الأكل for 2 weeks

* the above prescription named (triple therapy) made especially for H.Pylori infection & formed of 1 PPIs & 2 broad spectrum Abx (clarithromycin) .. * H.Pylori blood test should be performed first

Common cold & Influenza in Children نزلات البرد والإنفلونزا عند الأطفال



Rx : E-Mox 250 mg مضاد حيوي

ه ملي نصف معلقة صغيرة كل ٨ ساعات لمدة خمس أيام

Rx :

Balkis Syrup

مزيل لاحتقان الأنف (يوقف انسداد الأنف) والرشح
منعقة صغيرة صياحاً ومساءً



Abimol Syrup (like pyral) ملعقة صغيرة ٣ مرات يومياً يخفض الحرارة


Rx:
Coughseed children supp
لبوس شرجى ٣ مرات إذا كاتت نزلة البرد مصاحبة بكحة

Dr I Rasha Hany









Sudden cough longed for few davs + mucus + Fever + SOB نتيجة للسجائر أو عدوى بكتيرية أو فيروسية يجب على المريض التوقف فوراً عن التدخين والبعد عن الزحام والأماكن المئثة ويجب شرب كميات كبيرة من الماء

روشتة لعلام النزلة الشعبية الحادة

R/ Hibiotic 625 mg

قرص كل 8 ساعات لمدة 5-10 ايام

It is amoxicillin (others like augmentin)

مضاد حيوى

Mucophyline Syrup

ملعقة كبيرة 3 مرات يومياً بعد الأكل


it is bronchodilator and mucolytic


مذيب للبلغم

Abimol tab.

قرص إلى قرصين 3 مرات يومياً بعد الأكل contains paracetamol acts as antipyretic خافض للحرارة

Dr / Mido





الاكزيما الجليدية Atopic Eczema

R / Corticosteroid cream
(should be applied for less than 1 week to avoid side effects)

مرتين يوميأ

Allerfene tab (non sedating antihistaminic relief allergic reaction) قرص كل ٢٤ ساعة بعد الأكل

Kenacort vial (long acting corticosteroid used only for resistant cases)

مرة واحدة في العضل

Dr I Rasha Hany

^{**} Combination of tar & corticosteroid used in resistant cases of Eczema & Psoriasis.

^{**} Bentosal oint, Diprosalic oint used in eczema with hyperkeratinized skin

^{**} the cause should be avoided, eg: irritant clothing, chemicals and soaps.

Irritable bowel syndrome:

Brane tab

قرصين ٣ مرات يوميا قبل الأكل

بنهف ساعة

Librax

(قرص ٣ مرات يومياً (علبة واحدة

Colona

قرص ٣ مرات قبل الأكل بنصف ساعة

Spasmoamrase

قرص ٣ مرات بعد الأكل









نصابح لعلاج النزلة المعوية Gastroenteritis



تعويض السوائل المفقودة بكثرة لتجنب الجفاف

لبن - مكرونة - خضار مسلوق - مع غسل الطعام جيداً وتسخينه جيداً

إدخال الأغذية الطبيعية بالتدريج -


في اليوم الثانمي أكل البسكويت المالح والرز المسلوق

في اليوم الثالث نضيف اللحوم المسلوقة والبيض المسلوق

تجنب السكريات والأطعمة الحارة والمياه الغازية

ط/على السيد سلام





روشتة للكمة الجافة الناتجة عن المساسية Dry Allergic cough


R/ Congestal Syrup ملعقة 3 مرات يومياً بعد الأكل

Ventolin 2 mg tab. قرص 3 مرات يومياً بعد الأكل

Vendexine Syrup 20 مل مرتين بعد الأكل لمدة 3 أيام

Vendexine Syrup contains antihistamine chlorpheneramine & Dexamehasone which has magic antiallergic & cough relief effect ... but due to its side effects, it is added when other measures are not effetive & the patient case allows Corticosteroid Therapy.

Dr / Mido



Nasal Airway

* OM Symptoms are Earache + Fever + usually bad odour ear discharge.

*There is acute otitis media (AOM):in which there is discharge inside the ear & part of the ear is infected & Swollen ,, and There is otitis media with effusion (OME), discharge remain after the infection is over

روشتة لعدوى الأذن الوسطى

otitis media

Antibitotic Capsules

Bacticlor Caps.


کبسولة کل 8 ساعات / 7-1 أبام

Analgesic Ear drops

otosept مرات/يوم 312

also Cephalosporins are effective in OM every 8 hrs (cefardoxil) & Also Quinolones are effective every 12 hrs like (Ciprofloxacin)

Dr / Abd-Ulrahman Hamid





روشتة لتنشيط الدورة الدموية مثل ضعف الذاكرة وقلة التركيز وبرودة الأطراف والدوخة

R/ Stugeron tab قرص مرتين يومياً بعد الأكل

it contains cinnarizine, it inhibuts transport of calcium ions, also has the same actions of antihistamines thus inhibits VC.

R / Triviastal tab قرص بعد الأكل ٣ مرات يومياً

Dr / Rasha Hany



التبول اللإرادي عند الأطفال Pediatric Nocturnal Enuresis





Dr I Rasha Hany

Rx: Uripan Syrup Or Detronin

2.5-5 ml 2 times daily (at noon & night)

Contains Oxybutenin, inhibits urinary tract contraction (antispasmodic & antimuscarinic effect)

Psychological treatment

No punishment is a part of Therapy as High ratio of Enuresis is Psychological due to family troubles (Variation between brothers), but exclude pathological causes (UTI "prostatitis in male" & anatomical anomalies)

Avoid drinking water 1 hr before bed time Avoid diuretic drinking (tea & Coffe)




روشتة لإزالة رائحة القدم - القدم الرياضي Fungal infection between toes -Athletic Foot



Cansten Solution	يوضع مرتين يومياً بعد التنظيف بين الأصابع بماء دافئ وصابون	It has a broad spectrum antifungal activity.
Miconaz Powder	يوضع مرتين يوميا بعد المحلول	Contain Miconazole, a broad spectrum antifungal.

Dr / Rasha Hany







R / lodosept antiseptic soln.

(to clean the Abscess or the wound)

Fucidin

(applied 2-3 times daily)
(its cream form for Face & wet places)
(its ointment form for dry skin)

Verlosef 500 caps.

(1 cap / 8 hr after meals)





Dr / Rasha Hany


روشتة لقشرة الشعر Dandruff

R /
Nizapex Shampoo

يفرك الشامبو في الشعر بعد غسيله لمدة خمس
دقائق مرتين أسبوعياً

Rootage Cream یوضع یوم بعد یوم

many researches say that the main cause of Dndruff is fungal, and No antidandruff product can eradicate dandruff till now But Nizapex contain Ketoconazole with good antifungal antidandruff properteis.



روشتة لعلام ضغط الدم المنخفض Hypotension

R / Effortil drops

1 Odrops directly in the mouth or half glass of water 2-3 times daily



Dr / Rasha Hany

Advise patient to take salty food (old cheese)

one amps. of Dexamethasone may be given as supportive therapy in severe Hypotension

لعلاج الهالات السوداء حول العينين for ttt of Dark circles around the eyes

Shade out cream Or Pearlight cream



دهان للمنطقه الغامقه يوميا قبل النوم

خذ قسطك الكافي من النوم.

قد تكون الحساسية هي مسبب ظهور الهالات السوداء.. عالج الحساسيات التي تعاني منها. التزم بحمية غذانية متوازنة غنية بالمعادن والفيتامينات مع مراعاة شرب كمية كافية من الماء . تقليل الملح في الطعام

قلل من التوتر والقلق في حياتك



هناك العديد من العلاجات المنزلية المفيدة في علاج الهالات السوداء حول العينين، وهنا اخترا لكم مجموعة من أشهر العلاجات المشكلة الهالات السوداء وهي كالآتي

أغلق عينيك وضع عليها أكياس الشاي المثلجة أو مكعبات الثلج الملفوفة بقطعة قماش أو ملعقة مبردة في الثلاجة واتركها ل ١٠-١٥ دقيقة.. مادة التانين الموجودة بالشاي تقلل التورم أسفل العينين كما توحد اللون، ولأفضل النتائج قم بعمل ذلك مرة واحدة يومياً

مع أن هذه الوصفة مشهورة وتكاد تكون من أقدم الوصفات إلا أنها فعالة جدا ودات مفعول سريع في تخفيف السواد حول العينين هذه الوصفة تتضمن وضع شرائح الخيار على العينين لمدة ١٠-١٥ دقيقة.

استخدم مزيج عصيري الليمون مع الطماطم بمسح منطقة أسفل العينين بها او بوضع قطنة مبللة بها واتركها ل٣٠ دقيقة ثم اغسلها بالماء الدافيء


ادهن منطقة الهالات السوداء بمزيج من زيت اللوز وزيت جوز الهند واتركهما ل ٢٠ دقيقة ثم امسح المنطقة بقطنة نظيفة. الاستمرار على هذه الوصفة ل ١٠ ايام فقط كفيل بإزالة الهالات السوداء

قم بنقع بضع حبات من اللوز في الحليب لليلة كاملة ثم اطحن حبات اللوز وضعها على الهالات السوداء مرة واحدة يومياً وستلاحظ النتيجة بنفسك خلال ٧ أيام فقط! هذه الوصيفة أيضاً تفيد في إزالة التجاعيد أسفل العينين

اذا لم يقلح كل ما سبق خلال اسبوعين يقضل عمل صوره دم كامله لاستثناء الانيميا N.B

روشته علاج الكالزيون او البرده for TTT of chalazion

العلاج الأولي لمرض البردة هو استخدام كمادات ماء معقم دافئ لمدة ١٠ إلى ٢٠ دقيقة ٤ مرات يوميأ على الأقل



Surgery

If the chalazion does not go away within about one month, you should return to your doctor to discuss your options. When a chalazion does not heal after treatment, it may need to be surgically removed. This is especially true if it keeps growing, blocks your vision, or leads to an astigmatism (an abnormal curving of the cornea). Surgery is usually a last resort and it is rarely required because most chalazia clear up with a combination of medication and home remedies.











الإمساك عند الأطفال

Rx : Normalx drops فظرات قبل النوم DR / Rasha Hany



IF there is colic & Spasm

Rx:

Viseralgine Syrup ملي (نصف ملعقة صغيرة) للمغص

روشته لتقليل حجم الندرات مكان الجروح القديمه FOR TTT OS SCARS

Contractubex gel 18 L.E

دهان مرتين إلى ثلاث مرات لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر مع الضغط برفق على الندبي

ابدا بتدليك الندبة بالجل من المنتصف ثم قم بتوزيعه ببطء للخارج. استمر في التدليك بجل كونتراكتيوبكس بحركة دانرية صغيرة حتى يتم امتصاصه تمامًا

قد يجدي العلاج أيضًا مع الندبات القديمة. ولكن ينبغي تدليك جل كونتراكتيوبكستلاث مرات يوميًا لمدة ٦ أشهر على الأقل مع حالات الندبات القديمة

لا ينصح باستعمال جل كونتراكتيوبكس إلا بعد التنام الجروح تمامًا"

or

Scaro cream 45 L.E.

Scaro should not be used on open or ulcerated wounds as it does not help at that

stage (approximately used after 7-10 days from the wound occurrence).

Apply a suitable amount of Scaro on the needed (scar) site twice daily for 2-6 months or until the scar has almost disappeared.

Improvement in the appearance can begin in as little as 2 weeks. Individual results may vary.

For best results a minimum of 8-12 weeks of treatment is necessary











روسنات کیایات

Dr / Rasha Hany

روشتة لعلاج تساقط الشعر الغير وراثي Non Hereditary Hair loss

R /
HairStabil Shampoo

شامبو يفرك في الشعر لمدة خمس دقائق
ثم يشطف بالماء مرة يومياً

Tonoscalpine lotion لوشن يوم بعد يوم على الشعر المفسول الجاف

For hair & nail capsules


كبسولة مرتين يومياً لمدة شهر - ٣شهور
تحتوي على فيتامينات أو هو والزنك

روشته لعلاج التهاب مجرى البول

for TTT OF URINARY TRACT INFECTION

فى الحالات البسيطة او اللى فيها pus cells < 30/HPF Uvamin retard cap كبسولة كل ١٢ ساعة





URINCX

Front View of Urinary Tract

فى الحالات الشديده او اللى فيها pus cells > 30/HPF Ciprofar 500 mg قرص كل ١٢ ساعه مع الاكل قرص كل ١٢ ساعه مع الاكل لمده ٧ ايام على الاقل







قرص ٣ مرات يوميا قبل الاكل بنص ساعه



Coliurinal eff

معلقة على نص كوب ماء ٣ مرات يوميا بعد الاكل

Panadol tab

قرص عند ارتفاع درجه الحراره

- * Drink plenty of water to dilute your urine and help flush out bacteria.
- * Use a heating pad. Apply a warm, but not hot, heating pad to your abdomen to minimize bladder pressure or discomfort.
- * Avoid drinks that may irritate your bladder. Avoid coffee, alcohol and soft drinks containing citrus juices and caffeine
- Urinate when you have the urge. Don't hold your urine for a long time.
- Avoid constipation.
- * Urinate immediately after sexual intercourse. This is the best protection women have against UTIs, because it helps prevent bacteria from moving into the urethra.
- Post-menopausal women may want to ask their doctors about using vaginal estrogen to prevent recurrent UTIs.



ينصح بتناول عصير التوت البرى Cranberry juice حيث يكون له اثر قاتل على البكتيريا الموجودة

عدوى القم بالقطريات عند الأطقال Oral Fungal Infection in children



Miconaze oral gel

ملعقة فم القم كل 8 ساعات

Contain Miconazole (Broad spectrum antifungal)

^{*} Appears as Whitish cover over the tongue.



روشتة لإصابة الأظافر بالفطريات


> Nail Fungal Infection

Lamisil tab	قرص واحد يومياً لمدة ١٤ يوم _ يكرر كل شهر _	HE STATE OF THE PROPERTY OF TH
Trosyd nail solution	لمدة ٣ شهور يوضع مرتين يوميا لمدة ٦ شهور	



Dr / Rasha Hany

Fucidin cream sshould be added if there is Bacterial infection.



إذا استلزم الوقوف فيجب وضع إحدى القدمين على درجة وثني الركبة وتجنب المشي حافي القدمين على السيراميك.

-تجنب الجلوس أو الوقوف لفترات طويلة أكثر من · v دقيقة وإذا كان لا بد فنأخذ فاصل دقيقتين من الحركة.

- تجنب حدوث الإمساك وعلاجه جيداً بالملينات وتناول الخضروات والفواكه.

-عند النهوض من النوم :: يشني الشخص الركبتين ويستدير على جنبيه ثم الجلوس ثم القيام عن طريق دفع الأيدي وعكس الخطوات عند النوم.

- النوم على أحدا لجنبين مع وضع وسادة بين الفخذين + وضع وسادة تحت الركبتين والقدمين

روشته لعلاج الجليجل او شحاذ العين او دمل الجفن for TTT of stye

Hot compresses. These may help to ease soreness and draw the pus to a head. Hold a clean flannel, that has been in hot water, gently but firmly against the closed eye. Do this for 5-10 minutes, 3-4 times a day. (The water should be hot, but comfortable and not scalding.)

Okacin E.D Insert 2-3 times daily 1 drop into the lower cojunctival sac. Duration of the treatment is 7 to 9 days.

systemic antibiotic if needed Hibiotic 625 mg 1 tab 3 times daily

if no improvement within 7 days
Incision and drainage. A professional can perform
this procedure. It is like lancing a boil. A sterile
needle (or perhaps a scalpel) can be used to open
the stye and drain the pus. This should not be
attempted by yourself, as you might spread the
infection to the eyelid, with serious consequences.

N.B :Do not try to squeeze the pus out of a stye.

If the stye is not ready to burst, the infected pus may be squeezed into the tissue next to the stye, causing the infection to spread further.







لعلاج جفاف العين

for TTT of dryness of eyes

Tears natural E.D or Liquifilm tears E.D or Tears guard E.D

قطره للعين ٤ مرات يوميا

For people with blepharitis and other conditions that cause eyelid inflammation that blocks the flow of oil to the eye, frequent eyelid washing may help. To wash your eyelids:

Apply a warm washcloth to your eyes. Wet a clean cloth with warm water. Hold the cloth over your eyes for five minutes. Rewet the cloth with warm water when it cools. Gently rub the washcloth over your eyelids to loosen any debris.


Use a mild soap on your eyelids. Use baby shampoo or another type of soap recommended by your doctor. Put the soap on your clean fingertips and gently massage your closed eyes near the base of your eyelashes. Rinse the soap completely away.

Your doctor may recommend that you do this daily, even when you don't have dry eyes symptoms. Stopping this daily routine may cause your dry eyes to return.





Omega-3 and omega-6 fatty acids may help relieve dry eyes symptoms. These fatty acids, found in fish and vegetable oils, are thought to reduce inflammation in the body



نظام غذائسي لمريض القولون العصبي والانتفاخ

الإفطار:

كوب لبن أو بليلة (اللبن غير مستحب عند البعض)
بيضتان مسلوقتان أو جبن أو طبق صغير فول مصفي
خبز أبيض أو توست
كوب خفيف جداً من الشاي

الغذاء:

أرز أو مكرونة أو شعرية + لحم مسلوق أو مشوي أو سمك مشوي أو سبانخ أو قلقاس خبز أبيض أو توست

بطاطس مهروسة أو كوسة مسلوقة + تفاح أو عنب أو برتقال أو تبيزأو مشمش

الساعة الرابعة بعد الظهر: بسكويت أو كيك

العشاء:

ارز بلبن + مهلبية أو جيلي أو عسل نحل أو بطاطس مهروسة - بقدونس - خس



الأكل عدة مرات في اليوم "

- مع التقليل من الكربوهيدرات (الأرز المعركونة الخبز ع - زيادة تناول الملح . (غير مستحب)

- ملعقة عسل نحل كل ساعتين إذا لم يكن مويضاً بالسك

-تناول مشروب ساخز كل ٣ ساعات وخاصة القرفة - الزنجبيل -

القهوة – وحبة البركة.

ط/على السيد سلام

برجاء المراجعه قبل تطبيق أي من هذه الوصفات

#طب_العشوائيات